



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области»

**Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области в городе Первоуральск,  
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе  
Ревда»**

(Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской области»)

Вайнера ул., д. 4, г. Первоуральск, 623102  
тел.: (3439) 24-52-15  
факс: (343) 24-84-20

E-mail: [mail\\_11@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail_11@66.rospotrebnadzor.ru)  
<https://fbuz66.ru/>

ОКПО 77145708, ОГРН 1056603530510  
ИНН/КПП 6670081969/668443001

24.06.2025г.  
№ 66-20-011-17/15- -2025

#### Коклюш пути передачи, профилактика

Коклюш – это бактериальное заболевание, вызываемое бактерией *Bordetella pertussis*. Оно характеризуется приступами сильного кашля, которые могут длиться несколько недель. Коклюш может быть опасным для жизни, особенно для младенцев и маленьких детей.

Коклюш передается воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Бактерии могут попасть в воздух в виде мелких капель и вдохаться другими людьми. Коклюш наиболее заразен в течение первых 1-2 недель после появления симптомов.

Симптомы коклюша обычно появляются через 7-10 дней после заражения. Начальная стадия заболевания напоминает обычную простуду с такими симптомами, как:

- Насморк
- Чихание
- Незначительный кашель

Через 1-2 недели кашель усиливается и становится спазматическим. Приступы кашля могут длиться до минуты и сопровождаться:

- Свистящим звуком при вдохе (реприз)
- Рвотой
- Усталостью
- Синеватым оттенком кожи (цианоз)

Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коклюша. Вакцина против коклюша входит в состав комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС). В Российской Федерации предусмотрена 3-кратная вакцинация детей в возрасте 3 месяца, 4,5 месяцев, 6 месяцев и однократная ревакцинация в возрасте 18 месяцев.

Другие меры профилактики включают:

- Соблюдение правил гигиены, такие как мытье рук и прикрывание рта и носа при кашле или чихании
- Избегание контакта с больными коклюшем
- Использование защитных масок в местах скопления людей

Лечение коклюша обычно включает прием антибиотиков, таких как эритромицин или азитромицин. Антибиотики могут помочь уменьшить симптомы и предотвратить распространение инфекции.

Раннее выявление и лечение коклюша имеют решающее значение для предотвращения серьезных осложнений. Если вы подозреваете, что у вас или вашего ребенка коклюш, немедленно обратитесь к врачу.

Врач-эпидемиолог  
Первоуральского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области»  
Липатов К.А.