



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области»

**Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области в городе Первоуральск,  
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе  
Ревда»**

(Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской области»)

Вайнера ул., д. 4, г. Первоуральск, 623102  
тел.: (3439) 24-52-15  
факс: (343) 24-84-20

E-mail: [mail\\_11@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail_11@66.rospotrebnadzor.ru)  
<https://fbuz66.ru/>

ОКПО 77145708, ОГРН 1056603530510  
ИНН/КПП 6670081969/668443001

25.06.2025г.  
№ 66-20-011-17/15- -2025

### Профилактика малярии.

Малярия - заболевание, передающееся через укусы инфицированных комаров. Это заболевание может вызвать лихорадку, озноб, головную боль и мышечные боли. В тяжелых случаях малярия может привести к смерти.

Профилактика малярии включает в себя следующие меры:

- Используйте репелленты от насекомых. Репелленты от насекомых, содержащие ДЭТА, пикаридин или ИР3535, могут помочь отпугнуть комаров. Наносите репеллент на открытые участки кожи и одежду.
- Носите одежду с длинными рукавами и штанами. Это поможет создать барьер между вами и комарами.
- Спите под противомоскитной сеткой. Противомоскитные сетки могут помочь предотвратить укусы комаров ночью.
- Принимайте противомаларийные препараты. Противомаларийные препараты могут помочь предотвратить заражение малярией. Ваш врач может порекомендовать вам противомаларийный препарат, который подходит именно вам.
- Ограничьте пребывание на улице в сумерках и на рассвете. Комары наиболее активны в эти часы.
- Устраняйте стоячую воду вокруг вашего дома. Стоячая вода является рассадником комаров. Убедитесь, что в вашем доме и вокруг него нет стоячей воды.

Если вы путешествуете в район, где распространена малярия, важно принять меры предосторожности, чтобы защитить себя от этого заболевания. Следуя этим советам, вы можете снизить риск заражения малярией.

Симптомы малярии могут появиться через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Наиболее распространенными симптомами являются: лихорадка, озноб, головная боль, мышечные боли, усталость, тошнота, рвота, диарея. Если у вас появились какие-либо из этих симптомов, важно немедленно обратиться к врачу. Ранняя диагностика и лечение малярии могут снизить риск серьезных осложнений.

Малярия лечится противомаларийными препаратами. Ваш врач назначит вам противомаларийный препарат, который подходит именно вам. Важно принимать противомаларийные препараты в соответствии с предписаниями врача.

В настоящее время существует одна вакцина против малярии, одобренная для использования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вакцина называется RTS,S/AS01 (Москирикс). Вакцина RTS,S/AS01 показана для профилактики малярии у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, проживающих в регионах с умеренной или высокой передачей малярии. Вакцина RTS,S/AS01 вводится в виде четырех доз.

Вакцина RTS,S/AS01 является безопасной и эффективной вакциной против малярии. Однако вакцина не на 100 % эффективна. Важно продолжать принимать другие меры предосторожности, чтобы защитить себя от малярии, даже если вы были вакцинированы.

Врач-эпидемиолог Первоуральского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Мамаев М.Э.